

Endfofalk

Gastroenterologie

Dr. med. Jochen Emrich
Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie
Bodelschwinghstraße 10b

☎0 60 21/20 252
63739 Aschaffenburg
 圖0 60 21/21 89 54

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen ist eine Darmspiegelung (Koloskopie) geplant. Um die Untersuchung durchführen zu können, müssen Sie zuvor Ihren **Darm optimal reinigen**. Ist der Darm bei der Untersuchung nicht vollständig sauber, steigt nicht nur das Risiko von Komplikationen (z. B. Darmwandverletzung), sondern es verlängert sich auch die Untersuchungszeit und krankhafte Befunde könnten übersehen werden. Zudem verzögert sich der geplante Untersuchungsbeginn der Ihnen nachfolgenden Patienten. Wir bitten Sie daher, die Darmreinigung genauso durchzuführen wie es im Folgenden beschrieben ist.

In der Woche vor der Darmspiegelung

Verzichten Sie bitte auf körnerhaltige Nahrungsmittel (z. B. Vollkornprodukte, Müsli, Leinsamen, Mohn, Weizenkleie, Weintrauben, Kiwis, Wassermelonen, Erdbeeren) sowie Nahrungsmittel mit Haut oder harten Schalen (z. B. Tomaten, Hülsenfrüchte, Paprika, Mais, Nüsse).

Am Tag vor der Darmspiegelung

Nehmen Sie morgens ein leichtes Frühstück zu sich. Trinken Sie während des Tages dann soviel klare Getränke wie möglich. Zum Mittagessen sollten Sie bitte nur noch flüssige oder breiige Kost zu sich nehmen (z. B. Suppen, Pudding, Püree).

Nach dem Mittagessen bereiten Sie bitte die Darmreinigungslösung vor, indem Sie jeweils 2 Beutel des Pulvers erst in ½ Liter lauwarmen Wasser lösen und dann einen weiteren ½ Liter kaltes Wasser dazugeben. Stellen Sie so aus den 8 Beuteln insgesamt 4 Liter Reinigungslösung her. Sie können das Pulver alternativ auch in ungesüßten Tee bzw. klaren, kohlesäurefreien Fruchtsäften auflösen oder dem Wasser ungesüßte Geschmacksstoffe hinzufügen (z. B. Zitronenkonzentrat, Multivitaminbrausetabletten). Stellen Sie die Lösung anschließend in den Kühlschrank (schmeckt gekühlt am besten).

Beginnen Sie um 17.00 Uhr mit der Einnahme der ersten 2 Liter der Reinigungslösung. Sie sollten ca. alle 10 Minuten 1 Glas der Lösung trinken, so dass Sie 1 Liter in 1 Stunde getrunken haben. Nehmen Sie so insgesamt 2 Liter der Lösung in 2 Stunden zu sich (die verbliebenen 2 Liter sind für den Folgetag vorgesehen). Die abführende Wirkung setzt meist ca. 1 – 2 Stunden nach dem 1. Glas ein. Nebenbei dürfen Sie gerne in kleinen Mengen andere ungesüßte, kohlensäurefreie Flüssigkeiten trinken (Wasser, Tee, Kaffee ohne Milch, klare Brühe). Bedenken Sie aber, dass bereits 2 Liter der Reinigungslösung eine große Menge Flüssigkeit in kurzer Zeit sind. Sie sollten Ihren Magen nicht überlasten, da es sonst zu Erbrechen kommen kann. Körperliche Bewegung während der Vorbereitung verbessert die Qualität der Darmreinigung.

Zum Abendessen dürfen Sie nur noch eine klare Brühe und oben genannte Getränke zu sich nehmen.

Am Tag der Darmspiegelung

Endofalk

Eine optimale Darmreinigung ist erreicht, wenn Sie als **Stuhlgang nur noch klare bis allenfalls hell – gelb-liche Flüssigkeit** absetzen. Eine dunklere Farbe oder gar feste Bestandteile sprechen für eine unzureichende Reinigung mit den oben genannten ungünstigen Folgen. Dies sollte unbedingt vermieden werden!

Informieren Sie uns bitte bei Ankunft in der Praxis immer darüber, ob Sie die gesamte Reinigungslösung trinken konnten und wie der letzte Stuhlgang aussah. Wenn nötig, können dann noch weitere Maßnahmen (z. B. Einläufe) zur Verbesserung der Darmreinigung in der Praxis durchgeführt werden.

Wenn Sie regelmäßig **Medikamente** einnehmen müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor: die letzte Tabletteneinnahme sollte <u>spätestens</u> **2 Stunden vor** und dann wieder <u>frühestens</u> **2 Stunden nach** dem Trinken der Reinigungslösung erfolgen. Beachten Sie bitte, dass es trotzdem zu einem Wirkungsverlust von Medikamenten kommen kann (z. B. Antibabypille, hier bedarf es in jedem Fall zusätzlich alternativer Verhütungsmethoden). Wenn Sie **gerinnungshemmende Medikamente** (v. a. Marcumar, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Brilique, Heparin, Plavix, Iscover, Clopidrogel, Aggrenox, Lixiana o. a.) einnehmen, sprechen Sie uns bitte mind. **14 Tage vor der Darmspiegelung** an, damit wir mit Ihnen das weitere Vorgehen planen können.

Sollten sie zum Untersuchungszeitpunkt mit Heparinspritzen behandelt werden, dürfen Sie **am Vortag sowie am Tag der Darmspiegelung <u>kein</u> Heparin spritzen!**

Denken Sie bitte daran, sich für die Untersuchung ein **großes Badehandtuch** sowie ein **normales Handtuch** mitzubringen (bei gleichzeitig stattfindender Magenspiegelung bitte zwei kleine Handtücher mitbringen). Bitte verzichten Sie am Untersuchungstag auf **Lippenstift**, **Nagellack**, **künstliche Nägel** und lassen Sie alle nicht unbedingt notwendigen **Wertgegenstände** (z. B. Schmuck, Piercings, Geldbörse) zu Hause. Bei Wahlleistung **CO2 – Koloskopie** bringen Sie bitte die dafür notwendigen 25,- € in bar am Untersuchungstag mit.

Bitte bringen Sie eine Plastiktüte zum Verpacken ihrer während der Untersuchung **benutzen Handtücher** mit und beachten Sie, diese in der Praxis aus hygienischen Gründen nach der Untersuchung <u>nicht</u> mehr auszupacken.

Maßnahmen die das Trinken der Endofalklösung erleichtern können.

- Lutschen Sie während des Trinkens der Endofalklösung ein Bonbon oder lutschen Sie an einer Zitrone.
- Trinken sie nach einem Glas Endofalk einen <u>kleinen Schluck</u> ungesüßten Saft (am bestem Grapefruitoder Apfelsaft). Bitte nur so wenig wie möglich dazu trinken, da sonst die Lösung verdünnt wird und die Reinigungswirkung nachlässt.
- Morgens ca. 30 Minuten vor dem Trinken der Endofalklösung eine Tasse (nicht mehr !) warmen und hellen Tee oder eine <u>klare</u> warme Brühe trinken.

Für weitere **Fragen** stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung (Telefon: 06021 / 20252).

Ihr Praxisteam

<u>Stand:</u> 07/2025