

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen ist eine Dickdarmspiegelung (Koloskopie) geplant. Um die Untersuchung durchführen zu können, müssen Sie zuvor Ihren **Darm optimal reinigen**. Ist der Darm bei der Untersuchung nicht vollständig sauber, steigt nicht nur das Risiko von Komplikationen (z. B. Darmwandverletzung), sondern es verlängert sich auch die Untersuchungszeit und krankhafte Befunde könnten übersehen werden. Zudem verzögert sich der geplante Untersuchungsbeginn der Ihnen nachfolgenden Patienten. Wir bitten Sie daher, die Darmreinigung genauso durchzuführen wie es im Folgenden beschrieben ist.

Sollte Sie an einer **Phenylketonurie** oder einem **Glukose – 6 – Phosphatdehydrogenasemangel** leiden, informieren Sie uns bitte rechtzeitig, da dann dieses Präparat zur Darmreinigung nicht eingesetzt werden darf !

In der Woche vor der Darmspiegelung

Verzichten Sie bitte auf **körnerhaltige Nahrungsmittel** (z. B. Vollkornprodukte, Müsli, Leinsamen, Mohn, Weizenkleie, Weintrauben, Kiwis, Wassermelonen, Erdbeeren) sowie **Nahrungsmittel mit Haut oder harten Schalen** (z. B. Tomaten, Hülsenfrüchte, Paprika, Mais, Nüsse).

Am Tag vor der Darmspiegelung

Nehmen Sie morgens ein **leichtes Frühstück** zu sich. Trinken Sie während des Tages dann soviel **klare Getränke** wie möglich. Zum **Mittagessen** sollten Sie bitte nur noch **flüssige oder breiige Kost** zu sich nehmen (z. B. Suppen, Pudding, Püree).

Nach dem Mittagessen bereiten Sie bitte die Darmreinigungslösung vor, indem Sie jeweils das Pulver eines großen Beutel (A) und eines kleinen Beutel (B) in 1 Liter Wasser unter ständigem Rühren auflösen (dies kann bis zu 5 Minuten dauern). Stellen Sie so aus den 4 Beuteln insgesamt **2 Liter Reinigungslösung** her. Sie können das Pulver alternativ auch in ungesüßten Tee oder klaren Fruchtsäften ohne Kohlensäure auflösen bzw. dem Wasser ungesüßte Geschmacksstoffe hinzufügen (z. B. Zitronenkonzentrat, Multivitaminbrausetabletten). Stellen Sie die Lösung anschließend in den Kühlschrank (schmeckt gekühlt am besten).

Beginnen Sie um 17.00 Uhr mit der Einnahme des ersten Liters Reinigungslösung. Sie sollten ca. alle 10 Minuten 1 Glas der Lösung trinken, so dass Sie **1 Liter in 1 Stunde** getrunken haben. Die abführende Wirkung setzt meist ca. 1 – 2 Stunden nach dem 1. Glas ein. Anschließend müssen Sie noch 1 – 1,5 Liter andere ungesüßte und kohlensäurefreie Flüssigkeiten trinken (Wasser, Tee, Kaffee ohne Milch, klare Brühe). Sie sollten Ihren Magen aber nicht überlasten, da es sonst zu Erbrechen kommen kann. **Körperliche Bewegung** während der Vorbereitung verbessert die Qualität der Darmreinigung.

Zum **Abendessen** dürfen Sie nur noch eine klare Brühe und oben genannte Getränke zu sich nehmen.

Am Tag der Darmspiegelung

Bitte **kein Frühstück** einnehmen, erlaubt sind oben genannte Getränke. Beginnen Sie den noch verbliebenen **1 Liter der Darmreinigungslösung ca. 5 Stunden (..... Uhr) vor dem geplanten Untersuchungstermin** zu trinken. Sie sollten diesen wiederum in ca. 1 Stunde getrunken haben. Anschließend ist es notwendig, dass sie wieder ca. 1 – 1,5 Liter an ungesüßter und kohlensäurefreier Flüssigkeit (s. o.) trinken. Spätestens 2 Stunden vor der Untersuchung sollten Sie somit mit dem Trinken fertig sein. Ab diesem Zeitpunkt nehmen Sie bitte auch keine andere Flüssigkeit mehr zu sich.

Eine optimale Darmreinigung ist erreicht, wenn Sie als **Stuhlgang nur noch klare bis allenfalls hell – gelbliche Flüssigkeit** absetzen. Eine dunklere Farbe oder gar feste Bestandteile sprechen für eine unzureichende Reinigung mit den oben genannten ungünstigen Folgen. Dies sollte unbedingt vermieden werden !

Informieren Sie uns bitte bei Ankunft in der Praxis immer darüber, ob Sie die gesamte Reinigungslösung trinken konnten und wie der letzte Stuhlgang aussah. Wenn nötig, können dann noch weitere Maßnahmen (z. B. Einläufe) zur Verbesserung der Darmreinigung in der Praxis durchgeführt werden.

Wenn Sie regelmäßig **Medikamente** einnehmen müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor: die letzte Tabletteneinnahme sollte **spätestens 2 Stunden vor** und dann wieder **frühestens 2 Stunden nach** dem Trinken der Reinigungslösung erfolgen. Beachten Sie bitte, dass es trotzdem zu einem Wirkungsverlust der Medikamente kommen kann (z. B. Antibabypille, hier bedarf es in jedem Fall zusätzlich alternativer Verhütungsmethoden). Wenn Sie **gerinnungshemmende Medikamente** (v. a. Marcumar, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Brilique, Heparin, Plavix, Iscover, Clopidrogel, Aggrenox, Lixiana o. a.) einnehmen, sprechen Sie uns bitte mind. **14 Tage vor der Darmspiegelung** an, damit wir mit Ihnen das weitere Vorgehen planen können.

Sollten sie zum Untersuchungszeitpunkt mit Heparinspritzen behandelt werden, dürfen Sie **am Vortag sowie am Tag der Darmspiegelung kein Heparin** spritzen !

Denken Sie bitte daran, sich für die Untersuchung ein **großes Badehandtuch** sowie ein **normales Handtuch** mitzubringen (bei gleichzeitig stattfindender Magenspiegelung bitte zwei kleine Handtücher mitbringen). Bitte verzichten Sie am Untersuchungstag auf **Lippenstift, Nagellack, künstliche Nägel** und lassen Sie alle nicht unbedingt notwendigen **Wertgegenstände** (z. B. Schmuck, Piercings, Geldbörse) zu Hause. Bei Wahlleistung **CO2 – Koloskopie** bringen Sie bitte die dafür notwendigen 25,- € in bar am Untersuchungstag mit.

Bitte bringen Sie eine Plastiktüte zum Verpacken ihrer während der Untersuchung **benutzen Handtücher** mit und beachten Sie, diese in der Praxis aus hygienischen Gründen nach der Untersuchung **nicht** mehr auspacken.

Maßnahmen die das Trinken der Movipreplösung erleichtern können.

- Trinken Sie die Movipreplösung langsam in kleinen Schlucken, gerne z. B. mit einem Trinkhalm oder aus einer Trinkflasche (z. B. Fahrradflasche).
- Lutschen Sie während des Trinkens der Movipreplösung ein Bonbon oder lutschen Sie an einer Zitrone.
- Trinken sie nach einem Glas Moviprep einen **kleinen Schluck** ungesüßten und kohlenstofffreien Saft (am besten Grapefruit- oder Apfelsaft). Bitte nur so wenig wie möglich dazu trinken, da sonst die Lösung verdünnt wird und die Reinigungswirkung nachlässt.
- Morgens ca. 30 Minuten vor dem Trinken der Movipreplösung eine Tasse (nicht mehr !) warmen und hellen Tee oder eine klare warme Brühe trinken.

Für weitere **Fragen** stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung (Telefon: 06021 / 20252).

Ihr Praxisteam